

Bijlage 6 : Diagnoses en complicerende factoren bij OPD**AS1 diagnoses:****Myogene pijndiagnosen:**

Myalgie
Lokale myalgie
Myofasciale pijn
Myofasciale pijn met gerefereerde pijn

Artrogene pijndiagnosen:

Artralgie

Overige TMD pijndiagnosen

Hoofdpijn geassocieerd met TMD

Disfunctie diagnoses

Myogene bewegingsbeperking
ADD met reductie
ADD met reductie en intermitterende blokkade
ADD zonder reductie, zonder beperking
ADD zonder reductie, met beperking (sub-)Luxatie
Degeneratieve kaakgewrichtsafwijking

Andere niet-dentoalveolaire OPD

Neuropathieën
PDAP
Burning Mouth
Neurovasculaire pijn

Complicerende factoren:**Comorbiditeit met relatie tot OPD (etiologie en/of therapie):**

Ondermeer : systemische aandoening, groeistoornis, trauma, bestraling, PDS, FM, CVS, SOLK

Medisch gecompliceerd met invloed op etiologie en/of therapie

Zoals : Slaap-apneu, medicatiegebruik, middelengebruik

AS-2 factoren met invloed op etiologie en/of therapie

Aanwijzing voor psychosociale factoren zoals: chronische stress, depressiviteit, somatisatie, angst, catastrofen, verstoorde slaap, inadequate copingstijl, grote discrepantie tussen ernst aandoening en ervaren lijdensdruk

Gchiedenis / chroniciteit:

Klacht langer dan 6 maanden bestaand en/of meer dan één hulpverlener geconsulteerd voor dezelfde OPD en/of onvoldoende effect op eerdere therapie voor OPD

Mondgewoonten:

Slaap bruxisme , Waakbruxisme,
Overige persisterende mondgewoonten

Impact van de OPD:

Sterk verstoorde functie van het kauwstelsel n.a.v. OPD en/of
Sterke beïnvloeding sociale activiteiten n.a.v. OPD

Inadequate cognities / verwachtingen

Cognities van patiënt m.b.t. oorzaken OPD stroken niet met gangbare verklaringsmodellen en/of wensen of verwachtingen van patiënt aangaande te volgen therapie stemmen niet overeen met gangbare therapie bij OPD